

Roślina	przygotowanie dołu do sadzenia	przygotowanie bryły korzeniowej do sadzenia	wykonanie nasadzenia	nawadnianie	nawożenie	pielęgnacja
DEREN JADALNY „lekarski japoński”	odpowiedniej wielkości, ok. dwukrotnie większy od bryły korzeniowej rośliny, tak, aby po wyjęciu z pojemnika roślina swobodnie się zmieściła; w zależności od wielkości sadzonki, zazwyczaj ok 30cm szerokości na 40cm głębokości. Dodatkowo podłoże powinno być próchnicze, żyzne i zwięzłe, tak aby utrzymywało wilgoć. Glebę ciężką należy rozluźnić piaskiem, natomiast w przypadku gleby gliniastej podłoże należy rozluźnić szpadlem.	Przed wyjęciem z pojemnika należy namoczyć korzenie sadzonki ok.10-20 minut. Następnie należy delikatnie wyjąć roślinę z pojemnika i uważając by nie naruszyć części wierzchniej sadzonki. W przypadku rośliny w większym pojemniku nie należy wyciągać jej bezpośrednio z pojemnika, tylko delikatnie rozciąć pojemnik a następnie oddzielić sadzonkę. Ważne jest by nie uszkodzić korzenia rośliny, gdyż od jakości bryły korzeniowej zależy przyjęcie się sadzonki. Jeśli bryła korzenia jest mocno zbita można w kilku miejscach ją naciąć. Zabieg ten rozluźni korzenie i pozwoli na łatwiejsze przyjęcie się rośliny.	Roślina powinna zostać umieszczona w przygotowanym uprzednio dole tak by znalazła się na tej samej głębokości na której rosła. Po ustawieniu przysypujemy system korzeniowy i delikatnie ubijamy ziemię dookoła nasadu. Rośliny sadzone z pojemnika należy mocniej ubić przy zewnętrznej bryle korzeni, zapobiega to ewentualnemu przemieszczeniu się lub odchyleniu od pionu rośliny. Właściwe wykonanie ubicia gwarantuje szczelne przyleganie drobnych korzeni do gleby co zapobiega nadmiernemu osiadaniu rośliny w grunt.	Roślinę należy obficie podlać, jeśli po podlaniu ziemia wokół osiędzie odslaniając korzenie, konieczne jest uzupełnienie ubytków. Przez pierwsze 2 lata należy pamiętać o obfitym nawadnianiu, (lepiej rzadziej ale więcej niż częściej, ale mało)	Nawożenie nie jest z reguły wymagane.	Dereń powinien być silnie podcinany wczesną wiosną. Niecięta roślina оголаca się od dołu i traci charakterystyczne zabarwienie pędów.
BERBERYS "Orange Sunrise" "Auricoma"	dokładnie odchwaścić glebę w wokół planowego nasadu. W obrębie stanowiska chwasty można usunąć ręcznie lub chemicznie (chemiczna metoda musi zostać podjęta z wyprzedzeniem)	Bryłę korzeniową berberysów należy moczyć ok 10-20min.	Szyjka korzeniowa rośliny - czyli fragment między korzeniem a pniem powinien znajdować się na poziomie ziemi. W przypadku rośliny z pojemnika sadzonka powinna znajdować się na tej samej głębokości na jakiej rosła w pojemniku (ewentualnie 3-5cm poniżej gruntu) Następnie należy zasypać dołek ziemią i uklepać, w razie potrzeby konieczne jest	Nasad należy obficie podlać, przez pierwsze 2 lata Berberys wymaga systematycznego nawadniania, lepsze jest rzadsze natomiast obfitsze nawadnianie.	Roślina nie wymaga nawożenia, jedynie w przypadku słabszego wzrostu lub po upływie 3-4 lat od sadzenia.	Roślina wymaga corocznego przycinania wiosną, czyli skróceniu pędów, co powoduje ich szybszy wzrost oraz zagęszczenie. Co kilka lat można pozbyć się starszych pędów w ten sposób odmładzając roślinę.

			uzupełnienie ubytków. Dobrze jest uformować wokół rośliny zagłębienie, szeroką nieckę która będzie zatrzymywać wodę.			
TRAWA OZDOBNA - Turzyca rodzima	Dolek pod nasad powinien mieć średnicę ok 30cm na 45cm głębokości, tak, aby roślina swobodnie zmieściła się do środka. Należy także wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu.	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 15 -30min, następnie należy ją rozluźnić oraz skrócić o 1/3, zabieg ten pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych korzeni w nowym miejscu.		Przez pierwsze miesiące wymagane jest obfite nawadnianie rośliny, aż się ukorzeni.	Roślina nie wymaga nawożenia	Turzyce należy dzielić wczesną wiosną lub jesienią, wykopując kępki i rozrywając na kilka części. Następnie sadzimy na docelowe miejsce. Zaleca się jej okrywanie na zimę.
BYLINY Kostrzewa "Gauliera" "Popielata" "Miotlasta" "Sina"	Dolek pod byliny powinien mieć szerokość od 20-30cm, o głębokości 20-45cm. Musi być na tyle duży by system korzeniowy rośliny swobodnie się zmieścił.	System korzeniowy sadzonki należy namaczać przez 15-30 minut, tak by dobrze nasiąkł.	rękami rozluźnić bryłę korzeniową i skrócić korzenie o 1/3 długości. Ma to na celu pobudzenie rośliny do wypuszczenia nowych korzeni, roślina szybciej się przyjmie, i nastąpi jej szybszy wzrost. Kolejnym krokiem jest usunięcie suchych elementów sadzonki, co ma ewentualnie pozbycie się ognisk chorobotwórczych.		Ze względu na dużą przepuszczalność gruntów piaszkowych, dawkę nawóz należy podzielić na pół, a rośliny nawozić w 2-tygodniowych odstępach czasu.	Co 2-3 lata zaleca się stosowanie zabiegu odmładzania rośliny tzn. podział poprzez cięcie formujące.
Jarząb Arnolda 'Pink Veil' Sorbus x arnoldiana 'Pink Veil'	odpowiedniej wielkości, ok. dwukrotnie większy od bryły korzeniowej rośliny, tak, aby po wyjęciu z pojemnika roślina swobodnie się zmieściła; Dodatkowo podłoże powinno być próchnicze, żyzne i zwięzłe, tak aby utrzymywało wilgoć.	Bryłę korzeniową należy namoczyć.	Na dno dołu przygotowanego pod drzewo lub krzew należy nasypać żyznej gleby i umieścić na niej roślinę wyjętą z doniczki, uważając, by spomiędzy jej korzeni nie osypała się ziemia. Roślinom sadzonym z odkrytymi	przez pierwsze 2 lata obficie podlewać	Nawożenie wykonujemy wiosną, w pierwszych latach po posadzeniu.	zalecane okrywanie małych roślin na okres mrozów

	Glebę ciężką należy rozluźnić piaskiem, natomiast w przypadku gleby gliniastej podłoże należy rozluźnić szpadlem.		korzeniami należy przyciąć zbyt długie i uszkodzone korzenie, a następnie rozprostować je i rozłożyć na żyznej glebie w dołku. Następnie roślinę obsypuje się żyzną ziemią i ubija ją, a wokół jej pnia formuje się zagłębienie i wypełnia je wodą. Zapewnić stabilność rośliny przez przywiązanie do patyka.			
Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides	Dolek pod nasad powinien mieć średnicę ok 50cm na 80cm głębokości, , wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu.	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 10-20min.	umieszczamy w przygotowanym uprzednio dole tak by znalazła się na tej samej głębokości na której rosła. Po ustawieniu przysypujemy system korzeniowy i delikatnie ubijamy, nawadniamy; UWAGA: sadzimy jedną roślinę męską przy 2 żeńskich	w czasie suszy	nie wymaga	pędy zbyt zagęszczone lub nadmiernie rozrastające się na boki można usuwać
Klon pospolity 'Globosum'	usuwamy chwasty ręcznie lub chemicznie za pomocą herbicydu. Dolek musi być na tyle duży, by swobodnie wsadzić tam roślinę i obsypać bryłę korzeniową dookoła ziemią, wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 10-20min. skrócić korzenie ostrym sekatorem o 1/3 usunąć suche liście i pędy	umieszczamy w przygotowanym uprzednio dole , po ustawieniu przysypujemy system korzeniowy i delikatnie ubijamy, obficie nawadniamy	w czasie suszy	nie wymaga	Cięciu sanitarnemu podlegają: gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się ,wilki, odrosty korzeniowe.
Buk pospolity 'Dawyck' Fagus silvatica 'Dawyck'	usuwamy chwasty ręcznie lub chemicznie za pomocą herbicydu. Dolek musi być na tyle duży, by swobodnie wsadzić tam roślinę i obsypać bryłę korzeniową	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 10-20min. skrócić korzenie ostrym sekatorem o 1/3 usunąć suche liście i pędy	umieszczamy w przygotowanym uprzednio dole , po ustawieniu przysypujemy system korzeniowy i delikatnie ubijamy, obficie nawadniamy	w czasie suszy	nawóz zawierający podstawowe związki odżywcze takie jak azot, fosfor i potas	Cięciu sanitarnemu podlegają: gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się ,wilki, odrosty korzeniowe

	dookoła ziemią, wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu					
ognik szkarłatny	usuwamy chwasty ręcznie lub chemicznie za pomocą herbicydu. dołek o średnicy około 30 cm i 40 cm głębokości, , wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 10-20min. skrócić korzenie ostrym sekatorem o 1/3 usunąć suche liście i pędy	Na dno dolka wysypujemy pierwszą warstwę świeżej ziemi, następnie wkładamy bryłę korzeniową do dolka. Szyjka korzeniowa - fragment rośliny między korzeniami a pnem - powinna znajdować się na poziomie ziemi. W przypadku rośliny z pojemnika, sadzimy ją więc na tej samej głębokości, na jakiej rosła w pojemniku (ewentualnie 3-5cm niżej powierzchni gruntu), podlać obficie; do 4 szt/m2	w czasie suszy	Po zaprawieniu dolka żyzną ziemią przy sadzeniu, nawożenie możemy zacząć po upływie 3-4 lat, gdy zauważymy, że słabiej rośnie lub kwitnie.	
bluszcz pospolity	usuwamy chwasty ręcznie lub chemicznie za pomocą herbicydu. dołek o średnicy około 30 cm i 40 cm głębokości, , wzruszyć glebę na dnie i w ściankach wykopu	Bryłę korzeniową należy moczyć ok 15-30min. skrócić korzenie ostrym sekatorem o 1/3 usunąć suche liście i pędy	umieszczamy w przygotowanym uprzednio dole , po ustawieniu przysypujemy system korzeniowy i delikatnie ubijamy, obficie nawadniamy minimalny rozstaw 100 cm	w czasie suszy	nie wymaga	nie wymaga